

くすりのしおり

内服剤

2013年10月改訂

| | |
|--|---|
| 薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 | |
| 商品名：ビカルタミド錠 80mg「オーハラ」 主成分：ビカルタミド(Bicalutamide) 剤形：白色の錠剤、直径7.6mm、厚さ4.4mm シート記載：ビカルタミド80mg「オーハラ」、ビカルタミド「オーハラ」、80mg、 Bicalutamide 80mg「OHARA」、1日1回 |  |
| この薬の作用と効果について アンドロゲン（男性ホルモン）の受容体結合を阻害することで男性ホルモンの働きを抑えて、前立腺腫瘍の細胞増殖を抑えます。 通常、前立腺がんの治療に用いられます。 | |
| 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 <ul style="list-style-type: none">・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝障害がある。・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。 | |
| 用法・用量（この薬の使い方） <ul style="list-style-type: none">・あなたの用法・用量は<< >>：医療担当者記入>>・通常、成人は1回1錠（主成分として80mg）を1日1回服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | |
| 生活上の注意 | |
| この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、乳房腫脹、乳房圧痛、ほてり、勃起力低下などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 <ul style="list-style-type: none">・全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [劇症肝炎、肝機能障害、黄疸]・のどの痛み、発熱、皮下・粘膜下出血 [白血球減少、血小板減少]・発熱、から咳、呼吸困難 [間質性肺炎]・急激な胸の痛みや圧迫感を感じる、冷や汗が出る、息切れがする [心筋梗塞、心不全] 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。 | |
| 保管方法 その他 <ul style="list-style-type: none">・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。 | |
| 医療担当者記入欄 | 年 月 日 |

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。