

くすりのしおり

内服剂

2016 年 03 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:ロサルタンK錠 50mg「オーハラ」

主成分: ロサルタンカリウム (Losartan potassium)

剤形: 白色の割線入り錠剤、直径 7.6mm、厚さ 3.4mm

シート記載: ロサルタン K50mg「オーハラ」、血圧降下剤、OH-208、Losartan Potassium 50mg「OHARA」



この薬の作用と効果について

アンジオテンシン II 受容体拮抗作用により、血圧を下げ、また、蛋白尿を減らすなど腎臓を保護し、腎機能の悪化を抑える働きがあります。

通常、高血圧症、高血圧および蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。高カリウム血症、腎障害や肝障害、脳血管障害、体液量の減少がある。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << : 医療担当者記入>>
- ・ **高血圧症**：通常、成人は 1 回 1/2～1 錠（主成分として 25～50mg）を 1 日 1 回服用します。年齢・症状により適宜増減され、1 日 2 錠（100mg）まで増量されることがあります。必ず指示された服用方法に従ってください。
 - ・ **高血圧および蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎症**：通常、成人は 1 回 1 錠（主成分として 50mg）を 1 日 1 回服用しますが、血圧値により 1 日 2 錠（100mg）まで増量されることがあります。過度の血圧低下を起こすおそれがある場合は 1 回 1/2 錠（25mg）から開始されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
 - ・ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は飲まずに、次の服用時間から 1 回分を飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
 - ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
 - ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがありますので、高いところでの作業や自動車の運転など危険を伴う操作などには十分注意してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使うことができません。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに医師に相談してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、頭痛、めまい、吐き気、ほてり、低血圧、無力症/疲労などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、「」内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・蕁麻疹、呼吸困難、むくみ〔アナフィラキシー〕
- ・顔・唇・舌・のどがはれる〔血管浮腫〕
- ・食欲不振、全身倦怠感、皮膚や白目が黄色くなる〔急性肝炎または劇症肝炎〕
- ・尿量減少、全身のむくみ〔腎不全〕
- ・冷汗、吐き気、気を失う〔ショック、失神、意識消失〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。