

くすりのしおり

内服剤

2017 年 04 月改訂


薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「オーハラ」

主成分：サルボグレラート塩酸塩(Sarpogrelate hydrochloride)

剤形：白色の割線入り錠剤、直径 8.6mm、厚さ 4.2mm

シート記載：サルボグレラート塩酸塩 100mg「オーハラ」、サルボグレラート塩酸塩「オーハラ」、100mg、OH-307、Sarpogrelate Hydrochloride 100mg「OHARA」



この薬の作用と効果について

血小板や血管平滑筋でのセロトニンの受容体結合を阻害することで、血小板凝集や血管収縮を抑制し、血を固まりにくくして血液の流れを良くします。

通常、慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛および冷感などの虚血性諸症状の改善に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。出血している（血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、喀血、硝子体出血など）、腎障害がある。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回1錠（主成分として 100mg）を1日3回食後に服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、胸やけ、腹痛、発疹、発赤、丘疹、かゆみ、紅斑、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・頭痛、吐き気、吐血・下血〔脳出血、消化管出血〕
- ・鼻血、歯ぐきの出血、四肢などの皮下出血〔血小板減少〕
- ・全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる〔肝機能障害、黄疸〕
- ・のどの痛み、頭痛、寒さや震えを伴う高熱〔無顆粒球症〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。